

L'Office National des Mines s'est engagé depuis 2016 à la mise en place du premier géoparc en Tunisie: le géoparc du Dahar. Le projet de Géoparc a été motivé par l'originalité et la richesse du patrimoine géologique de la région. Parmi les nombreux atouts de ce territoire, on peut citer :

- un site unique en Afrique : le Permien supérieur marin du Jebel Tébaga de Médenine ;
- un intérêt scientifique et esthétique remarquable ;
- un patrimoine paléontologique exceptionnel, quasiment unique au niveau mondial ;
- un riche patrimoine historique et architectural.

La démarche engagée vise la sauvegarde de la géodiversité et la promotion du géopatrimoine auprès du grand public (habitants ou visiteurs) mais c'est surtout une opportunité pour le développement d'un tourisme alternatif. La labellisation par le réseau mondial des Géoparcs contribuera à la promotion de l'image de la région du Sud-est tunisien.

Mots-clés : Géoparc - Géosite - Géotourisme.

GISEMENT D'ICHTYOFAUNES D'ÂGE CRÉTACÉ TERMINAL DE L'OUARSENIS

BENHAMOU Miloud * et BRAHIM Mohamed *

* Université d'Oran, Faculté des Sciences de la Terre et de l'Univers, Département de Géologie, Laboratoire de Géodynamique des Bassins et Bilan Sédimentaire, Algérie. E-mail : milbenhamou@gmail.com.

La découverte d'une riche ichthyofaune dans les terrains marins du Crétacé terminal de l'Ouarsenis est une première en Algérie. Ces poissons fossiles comportent des espèces appartenant aux familles des Pycnodontidae, des Ichthyodectidae, des Plethodidae (= Tselfatiidae, Bananogmiidae) et des Dercetidae. Cette découverte est d'un intérêt capital et va permettre de compléter la connaissance paléobiogéographique de la région méditerranéenne durant cette période géologique. Jusqu'ici, en effet, les ichthyofaunes crétacées de la Mésogée eurafricaine étaient essentiellement connues au Maroc, au Portugal, en Italie, en Egypte, au Liban et en Palestine. L'événement de l'intervalle Cénomanien-Turonien dans l'Ouarsenis est interprété comme une surface de transgression maximale représentant une séquence de condensation. Cet événement est caractérisé par un "Niveau siliceux" riche en Foraminifères planctoniques globuleux (*Whiteinella*, *Globigerinelloides*, *Rotalipora*, *Hedbergella*, *Heterohelix*), associées à des Radiolaires et des calcsphères. De tels dépôts riches à la fois, en matière organique et en organismes siliceux indiquent l'événement CTBE (Cenomanian-Turonian Boundary Event ou OAE2) signalé dans les séries C/T dans plusieurs localités formant une ceinture continue le long de la plate-forme nord-africaine au cours de cette période du Crétacé englobant la Tunisie et l'Algérie atlasiques, et le Pré-rif marocain.

Mots-clés : Ichthyofaunes - Foraminifères - Radiolaires - Niveau siliceux - Black shales - Cénomanien-Turonien - Ouarsenis.